

Matematik A E2019


Uge 41, Forelæsning 2

Afsnit 7.4-7.7

Taylor-approksimation og elasticiteter

Taylor-approksimationer (7.4-5)

Approksimation af funktioner med polynomier



$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, n gange differentiabel i $a \in I$

Førsteordens/lineær approksimation ($n = 1$) omkring punktet a :

$$f(x) \approx A + B(x - a) = p_1(x)$$

$$A = p_1(a)$$

Bedste approksimation fås ved at kræve $p_1(a) = f(a)$ og $p'_1(a) = f'(a)$

Det giver:


$$A = f(a)$$

$$B = f'(a)$$

Altså:

$$p_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Bemærk: tangenten til f i punktet a



Andenordens-approksimation omkring a :

$$A = p_2(a)$$

$$f(x) \approx A + B(x - a) + C(x - a)^2 = p_2(x)$$


Bedste approksimation:

$$p_2(a) = f(a), \quad p'_2(a) = f'(a) \text{ og } p''_2(a) = f''(a)$$

$$\begin{aligned} A &= f(a) \\ B &= f'(a) \\ p''_2(x) &= 2C, \text{ dus } C = \frac{f''(a)}{2} \end{aligned}$$

Altså:

$$p_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2$$



Sådan kan fortsættes med approks.
af højere og højere grad...

Taylor-approksimationen/Taylor-polynomiet af grad n omkring punktet a :

$$p_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

(NB: $j! = j \cdot (j - 1) \cdot (j - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$) Ex : $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

"j fakultet"

p_n er det n 'te-gradspolynomium, der bedst approksimerer $f(x)$ tæt på punktet a , idet

$$p_n(a) = f(a), \quad p'_n(a) = f'(a), \quad p''_n(a) = f''(a), \quad \dots, \quad p_n^{(n)}(a) = f^{(n)}(a)$$

$$p_n^{(n)}(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1 = f^{(n)}(a)$$


Taylor polynomiet med sum-notation:

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x - a)^j$$

Def:
 $(f^{(0)}(a) = f(a))$
 (per definition er $0! = 1$)

Eksempel

$$f(x) = e^x$$



Find Taylorpolynomiet af grad n omkring punktet a :

$$f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

$$\begin{aligned} p_n(x) &= e^a + \frac{e^a}{1!}(x-a) + \frac{e^a}{2!}(x-a)^2 + \frac{e^a}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{e^a}{n!}(x-a)^n \\ &= e^a \left(1 + (x-a) + \frac{1}{2}(x-a)^2 + \frac{1}{6}(x-a)^3 + \dots + \frac{1}{n!}(x-a)^n \right) \end{aligned}$$

$$\overline{a=0}$$

$$p_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

Husk:

$$p_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$p_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Øvelse

$$f(x) = \ln(1+x)$$

1) Find Taylorpolynomiet af grad 3 omkring punktet $a = 0$

(Extra: Prøv også med Taylor-pol. af grad n)

$$f'(x) = (1+x)^{-1}, \quad f''(x) = - (1+x)^{-2}, \quad f'''(x) = 2(1+x)^{-3}$$

$$\begin{aligned} p_3(x) &= \ln(1) + \frac{1}{1!}x + \frac{-1}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 \\ &= \underline{x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3} \end{aligned}$$

2) Brug dette til at bestemme en approksimativ værdi for $\ln(1 + \frac{1}{10})$

$$\begin{aligned} \ln\left(1 + \frac{1}{10}\right) &\approx p_3\left(\frac{1}{10}\right) = \frac{1}{10} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{10}\right)^3 \\ &= 0,1 - 0,005 + 0,000333\dots = 0,095333\dots \end{aligned}$$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{10}\right) \approx 0,0953102$$

$$\text{"Fejl": } 0,000023$$

Taylors formel (7.6)

Lad p_n være Taylor-approksimationen for f omkring $a = 0$.

Forskellen mellem f og p_n i punkt x betegnes $R_{n+1}(x)$:

$$\begin{aligned} R_{n+1}(x) &= f(x) - p_n(x) \\ &= f(x) - \left(f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \right) \end{aligned}$$

”fejlen når vi approksimerer $f(x)$ med $p_n(x)$ ”

Altså har vi oplagt:

$$\begin{aligned} f(x) &= p_n(x) + R_{n+1}(x) \\ &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_{n+1}(x) \end{aligned}$$

Taylors formel med Lagranges restled:  med et specifikt udtryk for $R_{n+1}(x)$

Lagranges restled (7.6.2, s. 244):

Lad f være $n + 1$ gange differentiabel på interval, der indeholder 0 og x .

Da gælder:

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

for et tal z mellem 0 og x .

Anvendelse (eks fra tidligere): $f(x) = \ln(1+x)$

$$p_3(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

Da $f^{(4)}(x) = -3 \cdot 2(1+x)^{-4}$ får vi:

$$R_4(x) = \frac{-3 \cdot 2(1+z)^{-4}}{4!} x^4 = \frac{-(1+z)^{-4}}{4} x^4 = -\frac{1}{4}(1+z)^{-4} x^4$$

For $x > 0$ har vi så:

(for et $z \in (0, x)$)

$$|R_4(x)| = \frac{1}{4}(1+z)^{-4} x^4 < \frac{1}{4} x^4$$

Dvs: $|R_4(\frac{1}{10})| < \frac{1}{4} \left(\frac{1}{10}\right)^4 = 0,000025$

Kort om differentialer (7.4)

Lad f være differentiabel fkt og dx betegne (arbitrær) ændring i x .

Differentialet af $y = f(x)$ er så:

$$dy = f'(x) dx$$

Grafisk:




Figure 7.4.2 The differential dy and $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$

Regneregler for differentialer følger af de tilsvarende regler for differentialkvotienter (fx. differentialet af produktet af to fkt)

Elasticiteter (7.7)

- Priselasticitet for efterspørgsel på vare
 - "Hvis prisen stiger/falder med 1%, hvad er så den %-vise ændring i efterspørgslen?"
- Efterspørgsel som fkt. af pris: $D(p)$
- Betragt prisændring fra p til $p + \Delta p$
- Så kan vi udregne (gennemsnits-)priselasticiteten:

$$\frac{\frac{D(p+\Delta p) - D(p)}{D(p)} \cdot 100}{\frac{\Delta p}{P} \cdot 100} = \frac{P}{D(p)} \cdot \frac{D(p+\Delta p) - D(p)}{\Delta p}$$

hvis Δp er lille: $\approx \frac{P}{D(p)} \cdot D'(p)$

Elasticitet – generel definition

For en differentiabel funktion f med $f(x) \neq 0$ er elasticiteten mht x defineret ved:

$$\text{El}_x f(x) = \frac{x}{f(x)} f'(x)$$

Husk fortolkning: Elasticiteten giver os (approximativt) den procentvise ændring i funktionsværdien ved en ændring på 1% i x-værdien

NB:

- Differentialkvotienter: Absolotte ændringer
- Elasticiteter: Relative ændringer!

Øvelse

$$\text{El}_x f(x) = \frac{x}{f(x)} f'(x)$$

Bestem elasticiteterne for følgende funktioner:

$$f(x) = \sqrt{2x} \quad (\text{hvor } x > 0) \quad \leftarrow \text{pingo.coactum.de (708646)}$$

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2x}} = \frac{1}{\sqrt{2x}}$$

$$\text{El}_x f(x) = \frac{x}{\sqrt{2x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x}} = \frac{x}{2x} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$g(x) = \ln(x^2 + 1)$$

$$g'(x) = 2x \cdot \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

$$\text{El}_x g(x) = \frac{x}{\ln(x^2 + 1)} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{2x^2}{\ln(x^2 + 1) \cdot (x^2 + 1)}$$

