

Matematik A E2019

Uge 45, Forelæsning 2

Afsnit 11.1, 11.3(-s.420), 11.5

Funktioner af flere variable:

Intro og grundlæggende begreber

Funktioner af to variable: Intro

- I økonomi støder vi ofte på situationer, hvor en (afhængig) variabel bestemmes af to eller flere (uafhængige) variable

- Forbrugssituation med to varer, forbrugers præferencer modelleres vha. nyttefunktion:

$$u(x, y)$$


- Produktion med to inputs (fx. arbejdskraft og kapital), en virksomheds output modelleres vha. produktionsfunktion:

$$F(L, K)$$

- Marked med to producenter ("duopol"), hver producents profit afhænger både af egen produktion og af konkurrentens produktion:

$$\pi_i(q_1, q_2), \quad i = 1, 2$$

Funktioner af to variable (11.1)



Lad $D \subseteq \mathbb{R}^2$ ($\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$)

En (reel) funktion f af to reelle variable x, y med *definitions­mængde* (domain) D er en forskrift/”regel”, der til ethvert $(x, y) \in D$ knytter et reelt tal

$$f(x, y)$$


En sådan funktion skrives også $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

Hvis $D = \mathbb{R}^2$ skrives altså $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Eksempler:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \text{ for alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$g(x, y) = \sqrt{x} + xy \text{ for alle } (x, y) \text{ med } x \geq 0$$



Værdimængde (range) for $f : D \rightarrow \mathbb{R}$:

$$R_f = \{f(x, y) : (x, y) \in D\}$$

”alle de værdier f antager”

Øvelse:

Find definitionsområdet og værdimængden for funktionen givet ved forskriften

$$f(x, y) = x^2 + \sqrt{4 - y^2}$$

Skitsér definitionsområdet i et x, y -koordinatsystem


Def.mgd: Eneste restriktion : $4 - y^2 \geq 0$,
dvs $y^2 \leq 4$

Der er alle (x, y) med $-2 \leq y \leq 2$.

Værdimængde: $f(x, y) \geq 0$ for alle $(x, y) \in D$

$$f(x, 2) = x^2 + \sqrt{4 - 2^2} = x^2$$

Derfor : $R_f = [0, \infty)$



Graf og niveau-kurver (11.3, -s.420)

Lad $D \subseteq \mathbb{R}^2$ og $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

Grafen for f består af punkterne $(x, y, f(x, y))$, hvor $(x, y) \in D$, i det tredimensionale rum (\mathbb{R}^3)


Med mængdenotation kan grafen skrives:

$$G(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \text{ og } z = f(x, y)\}$$

Eksempel:

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ givet ved $f(x, y) = x^2 + y^2$

punkterne: $(x, y, x^2 + y^2)$



En *niveau-kurve* (level curve) for en funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ består af punkter $(x, y) \in D$, der giver samme funktionsværdi.


Altså er en niveau-kurve givet ved ligningen

$$f(x, y) = c, \quad \text{hvor } c \text{ er en konstant}$$

Ved at betragte forskellige konstanter c , fås de forskellige niveau-kurver for f

Eksempel:


$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ givet ved } f(x, y) = x^2 + y^2$$



Niveau-kurver:

$$x^2 + y^2 = c$$

Cirkel med centrum $(0,0)$
og radius \sqrt{c}
(for $c > 0$)



Eksempler fra økonomi

Nyttefunktion (fra nyttemax-problem i uge 40):

$$u(x, y) = \frac{1}{3} \ln(x) + \frac{2}{3} \ln(y), \quad \text{hvor } x, y > 0$$

Niveaukurver: ”Indifferenskurver”, hver kurve består af varebundter (x, y) , der giver forbrugeren samme nytte

Ligning for indifferenskurver:

$$\frac{1}{3} \ln(x) + \frac{2}{3} \ln(y) = c$$

Øvelse: Vis at denne ligning kan omskrives til

$$y = \frac{C}{x^{\frac{1}{2}}} \quad (\text{hvor } C = e^{\frac{3c}{2}})$$

$$\frac{1}{3} \ln(x) + \frac{2}{3} \ln(y) = c$$

$$\ln(x) + 2 \ln(y) = 3c$$

$$e^{\ln(x) + 2 \ln(y)} = e^{3c}$$


$$e^{\ln(x)} \cdot e^{2 \ln(y)} = e^{3c}$$

$$x \cdot y^2 = e^{3c}$$

$$y^2 = \frac{e^{3c}}{x}$$

$$y = \frac{e^{\frac{3c}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}}$$

Grafisk for $C = 1, 2, 4, 10, 20$



Bemærk: Forbrugeren er indifferent ml. varebundterne $(1, 4)$ og $(4, 2)$
(ved udregning kan checkes at $u(1, 4) = u(4, 2)$)

Nyttemax-problem:

$$\max_{x, y > 0} \frac{1}{3} \ln(x) + \frac{2}{3} \ln(y) \quad \text{u.b.} \quad px + qy = m$$

Ved løsning fik vi efterspørgselsfunktionerne:

$$\text{Vare 1: } x^* = \frac{m}{3p} \qquad \text{Vare 2: } y^* = \frac{2m}{3q} \qquad (\text{for } p, q, m > 0)$$

Generelt nyttemax-problem:

$$\max_{x, y \geq 0} u(x, y) \quad \text{under bibetingelsen} \quad px + qy \leq m$$

Med passende antagelser fås ved løsning efterspørgselsfkt:

$$x^*(p, q, m) \qquad y^*(p, q, m)$$

Funktioner af de tre variable $p, q, m > 0$

Produktionsfunktion:

$$F(L, K), \quad \text{hvor } L, K \geq 0$$

Niveaukurver: "Isokvanter", hver kurve består af kombinationer af arbejdskraft og kapital (L, K), der giver samme output

Cobb-Douglas produktionsfunktion (se ex 11.1.3-4, s. 408-9):

$$F(L, K) = AL^a K^b \quad (A, a, b > 0 \text{ er konstanter})$$

Hvad sker der med produktionen, hvis vi ganger alle inputs med $t > 0$?

$$F(tL, tK) = A(tL)^a (tK)^b = A t^a L^a t^b K^b = t^{a+b} A L^a K^b = t^{a+b} F(L, K)$$

Virksomhedens profitfunktion:

$$\pi(L, K) = pF(L, K) - wL - rK,$$

hvor p er prisen på output, w er prisen på arb.kraft og r er (leje)prisen på kapital

Profitmaksimeringsproblem:

$$\max_{L, K \geq 0} pF(L, K) - wL - rK$$

Hvis entydig løsning for alle $p, w, r > 0$ fås heraf virksomhedens "input-efterspørgselsfunktioner":

$$L^*(p, w, r) \qquad K^*(p, w, r)$$

Funktioner af de tre variable $p, w, r > 0$

Funktioner af n variable (11.5)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \text{hvor } (x_1, \dots, x_n) \in D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Eksempler:

$$u(x_1, \dots, x_n) = a_1 \ln(x_1) + \dots + a_n \ln(x_n) = \sum_{i=1}^n a_i \ln(x_i)$$

(hvor $a_1, \dots, a_n > 0$ er konstanter)

$$f(x, y, z) = x^2 y - xz$$

Værdimængden er igen alle de værdier, som f antager

Grafen består nu af punkterne $(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))$ i \mathbb{R}^{n+1}

Lign. $f(x_1, \dots, x_n) = c$ giver nu niveau-(hyper)flader i \mathbb{R}^n

Øvelse (kun hvis tid)

Betragt funktionen givet ved

$$f(x, y, z) = x^2y - xz \quad \text{for alle } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

Udregn

$$f(x+h, y, z) - f(x, y, z)$$

$$= (x+h)^2y - (x+h)z - f(x, y, z)$$

$$= (x^2 + 2hx + h^2)y - (x+h)z - f(x, y, z)$$

$$= \underline{x^2y} + 2hxy + h^2y - \underline{xz} - hz - (\underline{x^2y} - \underline{xz})$$

$$= 2hxy + h^2y - hz$$

$$= \underline{h(2xy - z) + h^2y}$$