

Matematik A E2019

Uge 47, Forelæsning 2

Afsnit 13.1-3

Funktioner af flere variable:

Nødvendige og tilstrækkelige betingelser for globale og lokale ekstremumpunkter

Lidt overblik

- I dag: “Ekstremumsbestemmelse” for funktioner af 2 variable
 - Nødvendige førsteordensbetingelser (13.1)
 - Tilstrækkelige anden-ordensbetingelser for lokale ekstremumpunkter (13.3)
 - Tilstrækkelige betingelser for globale ekstremumpunkter (13.2)
 - Vigtige og ofte anvendte resultater!
- Husk prøveeksamen/lynprøve fredag d. 6. dec!!!
 - Se dokument i øverste modul på Absalon (“Lynprøver E19”) for praktiske detaljer
 - Pensum til prøveeksamen: Alt stof fra forelæsningsplanen til og med denne uge (47). Opgaverne til holduv. næste uge er således også relevante for prøveeksamen.

Nødv. førsteordensbet. (13.1)

Betragt funktion $f(x, y)$ defineret på $S \subseteq \mathbb{R}^2$

$(x_0, y_0) \in S$ er et *globalt maksimumspunkt* for f hvis

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \text{ for alle } (x, y) \in S$$

$(x_0, y_0) \in S$ er et *lokalt maksimumspunkt* for f hvis

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \text{ for alle } (x, y) \text{ i en omegn af } (x_0, y_0)$$

[”i omegn af (x_0, y_0) ”: I lille cirkelskive med centrum (x_0, y_0)]

Bemærk:


Strengt globalt/lokalt max-pkt, hvis der gælder ”>” i definitionen

Et globalt max-pkt er et lokalt max-pkt, men det omvendte gælder ikke nødvendigvis

Globalt/lokalt minimumspunkt defineres tilsvarende

Grafiske eksempler på globale/lokale ekstremumpunkter:

$(x_0, y_0) = (0, 0)$ er et globalt min-pkt for $f(x, y) = x^2 + y^2$:





$$f(x, y) \geq 0 \text{ for alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$f(0, 0) = 0$$

Altså er $(0, 0)$ et globalt min-pkt.

$(x_0, y_0) = (0, 0)$ er et lokalt max-pkt for $f(x, y) = 5e^{-(x^2+y^2)} + x^2 + y^2$:




$(0, 0)$ er ikke et globalt max-pkt!

Lad (x_0, y_0) være lokalt maksimumspunkt for $f(x, y)$ (og et "indre pkt" i S)

Betragt følgende funktioner af én variabel:

$$g(x) = f(x, y_0)$$

$$h(y) = f(x_0, y)$$



Da (x_0, y_0) er lokalt max-pkt for f er:

x_0 lokalt max-pkt for g

y_0 lokalt max-pkt for h

Derfor:

x_0 er kritisk pkt for for g : $g'(x_0) = f'_1(x_0, y_0) = 0$

y_0 er kritisk pkt for for h : $h'(y_0) = f'_2(x_0, y_0) = 0$

Altså: (x_0, y_0) er et *kritisk punkt* for funktionen f

(kaldes også et *stationært pkt*)

[NB: samme udledning kan laves, hvis (x_0, y_0) er minimumspunkt]

Theorem 13.1.1 (s. 496): Nødvendige førsteordensbetingelser

Lad $f(x, y)$ være en funktion defineret på $S \subseteq \mathbb{R}^2$

Hvis (x_0, y_0) er et indre lokalt ekstremumpunkt (max- eller min-punkt), så er (x_0, y_0) et kritisk punkt, dvs.

$$f'_1(x_0, y_0) = 0 \quad \text{og} \quad f'_2(x_0, y_0) = 0$$

(Bemærk: Det antages, at de partielle afledede eksisterer)

Altså: Når vi søger efter indre ekstremumpunkter for f , så kan vi nøjes med at lede blandt de punkter, der opfylder førsteordensbetingelserne (FOCS)

$$f'_1(x, y) = 0 \quad \text{og} \quad f'_2(x, y) = 0$$


Kort øvelse:

Vis, at funktionen $f(x, y) = (2x - 6)^2 + 3y^4$ har globalt minimumspunkt i $(3, 0)$. Check, at dette er et kritisk punkt

$$f(x, y) \geq 0 \text{ for alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(3, 0) = 0 \quad \rightarrow (3, 0) \text{ glob. min-pkt.}$$

$$f'_1(x, y) = 2(2(2x - 6)) = 8x - 24 \quad \left. \begin{array}{l} f'_1(x, y) = 2(2(2x - 6)) = 8x - 24 \\ f'_2(x, y) = 12y^3 \end{array} \right\} f'_1(3, 0) = f'_2(3, 0) = 0$$

$$\rightarrow (3, 0) \text{ kritisk pkt.}$$



Tilstr. bet. for lokale ekstrem.-pkt (13.3)

For funktioner af én variabel (uge 40, forelæsning 2):

Sætning (8.6.2), s. 308:

Lad $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ være to gange diff. og c være et indre kritisk pkt.

Hvis $f''(c) < 0$, så er c et (strengt) lokalt maksimumspunkt.

Hvis $f''(c) > 0$, så er c et (strengt) lokalt minimumspunkt.

Et lignende (men mere komplekst) resultat gælder for funktioner af to variable!

Vi skal have fat i alle de fire anden-ordens partielle afledede, som jo indgår i Hessematricen:

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} f''_{11}(x, y) & f''_{12}(x, y) \\ f''_{21}(x, y) & f''_{22}(x, y) \end{pmatrix}$$

Men først: **Definition af ”saddelpunkt”** (s. 504)


Lad $f(x, y)$ være funktion defineret på S og (x_0, y_0) et indre pkt i S

At (x_0, y_0) er et kritisk punkt for f , er en nødvendig *men ikke tilstrækkelig* betingelse for, at (x_0, y_0) er et lokalt ekstremumpunkt for f


Saddelpunkt: Et kritisk punkt, der ikke er et lokalt ekstremumpunkt

Eksempler:

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$
$$(x_0, y_0) = (0, 0)$$



$$f(x, y) = x^2 y$$
$$(x_0, y_0) = (0, 0)$$



Theorem 13.3.1, s. 505-6:

Anden-ordens test for lokale ekstremumpkt.

Lad $f(x, y)$ være en C^2 -funktion på mængden S .

Lad (x_0, y_0) være et indre kritisk punkt for f .

Definér:

$$A = f''_{11}(x_0, y_0), B = f''_{12}(x_0, y_0) = f''_{21}(x_0, y_0) \text{ og } C = f''_{22}(x_0, y_0)$$

Så gælder:

- Hvis $A < 0$ og $AC - B^2 > 0$, så er (x_0, y_0) et (strengt) lokalt maksimumspunkt
- Hvis $A > 0$ og $AC - B^2 > 0$, så er (x_0, y_0) et (strengt) lokalt minimumspunkt
- Hvis $AC - B^2 < 0$, så er (x_0, y_0) et saddepunkt
- Hvis $AC - B^2 = 0$, så kan (x_0, y_0) være et lokalt max-pkt, et lokalt min-pkt eller et saddepunkt


Eksempel/øvelse: $f(x, y) = x^3 - 3x^2 + 2y^2$

Bestem alle kritiske punkter

$$f'_1(x, y) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'_2(x, y) = 4y$$

$$\left. \begin{array}{l} 3x(x-2) = 0 \\ 4y = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = 0 \text{ eller } x = 2 \\ y = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{krit. pkt} \\ (0, 0) \text{ og } (2, 0) \end{array}$$



Prøv for hvert kritisk pkt at afgøre, om det er et lokalt max-pkt, et lokalt min-pkt eller et saddepunkt

$$f''_{11}(x, y) = 6x - 6$$

$$f''_{22}(x, y) = 4$$

$$f''_{12}(x, y) = 0$$

$$\underline{(0, 0)}: A = -6 < 0 \quad C = 4 \quad B = 0$$

$$AC - B^2 = -24 < 0 \quad \rightarrow \underline{(0, 0) \text{ er et saddepunkt}}$$

$$\underline{(2, 0)}: A = 6 > 0 \quad C = 4 \quad B = 0$$

$$AC - B^2 = 24 > 0 \quad \rightarrow \underline{(2, 0) \text{ er et lok. min-pkt}}$$

En smule baggrund for Thm 13.3.1

- Hvis $A < 0$ og $AC - B^2 > 0$, så er (x_0, y_0) et (strengt) lokalt maksimumspunkt

”Hvor kommer disse betingelser fra?”


$$A = f''_{11}(x_0, y_0) < 0:$$

Sikrer, at fkt $g(x) = f(x, y_0)$ har lok. max-pkt i (x_0, y_0)
($A = g''(x_0)$)

Dvs. at f betragtet som fkt kun på linien $y = y_0$ har lok. max-pkt i (x_0, y_0)

De to betingelser sikrer tilsammen,
at det tilsvarende gælder for f på enhver linie gennem (x_0, y_0)

Og det sikrer endelig, at $f(x, y)$ faktisk har lok. max-pkt i (x_0, y_0)



Tilstr. bet. for glob. ekstrem.-pkt (13.2)

For funktioner af én variabel (uge 40, forelæsning 1):

Lad $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ og c være et (indre) kritisk pkt.


Hvis f er konkav ($f''(x) \leq 0$), så er c et maksimumspunkt.

Hvis f er konveks ($f''(x) \geq 0$), så er c et minimumspunkt.

Et lignende resultat gælder for funktioner af to variable!

Men det er mere komplekst at checke konkavitet/konveksitet af f

Nyt begreb: Konveks mængde i \mathbb{R}^2
(s. 500)



Theorem 13.2.1, s. 500-1:

Tilstr. betingelser for globale max- og min-pkt

Lad $f(x, y)$ være en C^2 -funktion på den konvekse mgd S .

Lad (x_0, y_0) være et indre kritisk punkt for f .

- (x_0, y_0) er et globalt max-pkt for f på S , hvis der for alle $(x, y) \in S$ gælder:

$$f''_{11}(x, y) \leq 0, \quad f''_{22}(x, y) \leq 0 \quad \text{og} \\ f''_{11}(x, y)f''_{22}(x, y) - [f''_{12}(x, y)]^2 \geq 0$$

- (x_0, y_0) er et globalt min-pkt for f på S , hvis der for alle $(x, y) \in S$ gælder:

$$f''_{11}(x, y) \geq 0, \quad f''_{22}(x, y) \geq 0 \quad \text{og} \\ f''_{11}(x, y)f''_{22}(x, y) - [f''_{12}(x, y)]^2 \geq 0$$

Simpelt eksempel (fra tidligere kort øvelse):

$$f(x, y) = (2x - 6)^2 + 3y^4 \text{ for alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$f'_1(x, y) = 2(2(2x - 6)) = 8x - 24 \quad \text{konveks mgd!}$$


$$f'_2(x, y) = 12y^3$$

$(x_0, y_0) = (3, 0)$ er kritisk punkt

$$f''_{11}(x, y) = 8 \geq 0 \quad f''_{22}(x, y) = 36y^2 \geq 0$$

$$f''_{11}(x, y)f''_{22}(x, y) - [f''_{12}(x, y)]^2 = 8 \cdot 36y^2 \geq 0$$

→ Thm 13.2.1 giver da, at $(3, 0)$ er et globalt minimumspunkt



$$f''_{12}(x, y) = 0$$